

5.1 연습문제

1.

풀이

(a) $\lim_{x \rightarrow -3-} f(x) = -3$

(b) $\lim_{x \rightarrow -3+} f(x) = -2$

(c) $x \rightarrow -3$ 일 때, 좌극한과 우극한이 서로 다르므로 $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

(d) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 3$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$

(f) $x \rightarrow 0$ 일 때, 좌극한과 우극한이 서로 다르므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

3.


풀이

(a) $0 < x < 1$ 에서 $x^2 - 1 < 0$ 이므로 $f(x) < 0$ 이고 $x > 1$ 에서 $x^2 - 1 > 0$ 이므로 $f(x) > 0$ 이다. 또한 $0 < x < 1$ 이고 $x \rightarrow 1-$ 이면, 분자는 상수 1로 수렴하지만 분모는 $x^2 - 1 \rightarrow 0$ 이므로 $f(x) \rightarrow -\infty$ 이고, 따라서 좌극한은 음의 무한대이다. $x > 1$ 이고 $x \rightarrow 1+$ 이면, 분자는 상수 1로 수렴하지만 분모는 $x^2 - 1 \rightarrow 0$ 이므로 $f(x) \rightarrow \infty$ 이고, 따라서 우극한은 양의 무한대이다. 따라서 $x \rightarrow 1$ 일 때, 함수 $\frac{x}{x^2 - 1}$ 의 극한은 존재하지 않는다.

(b) $y = \log_2 x$ 에 대하여 $x \rightarrow 2-$ 이면 $\log_2 x \rightarrow 1$ 이고, $x \rightarrow 2+$ 이면 $\log_2 x \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \log_2 x = 1$ 이다.

(c) $y = 3^{-x}$ 에 대하여 $x \rightarrow 1-$ 이면 $3^{-x} \rightarrow \frac{1}{3}$ 이고, $x \rightarrow 1+$ 이면 $3^{-x} \rightarrow \frac{1}{3}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} 3^{-x} = \frac{1}{3}$ 이다.

(d) $x \rightarrow 1-$ 이면, $x^2 - 1 \rightarrow 0$ 이고 $x \rightarrow 1+$ 이면, $x^2 - 1 \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} |x^2 - 1| = 0$ 이다.



5.

풀이

$y = \frac{x+1}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1}$ 이므로 함수 $y = \frac{x+1}{x-1}$ 는 $y = \frac{2}{x}$ 를 x 축 방향으로 1만큼 y 축 방향으로 1만큼 평행이동한 다음과 같은 그래프를 갖는다.


(a) $x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ 이고 따라서 $\frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$ 이다.

(b) $x \rightarrow -\infty$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이고 따라서 $\frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$ 이다.

(c) $x \rightarrow 1-$ 이면 $x-1 < 0$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ 이고 $\frac{x+1}{x-1} \rightarrow -\infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$ 이다.

(d) $x \rightarrow 1+$ 이면 $x-1 > 0$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ 이고 $\frac{x+1}{x-1} \rightarrow \infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x+1}{x-1} = \infty$ 이다.

그러므로 수평점근선 $y = 1$ 과 수직점근선 $x = 1$ 을 갖는다.



5.2 연습문제

1.

 풀이

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \lim_{x \rightarrow 0} [3f(x) + g(x)] &= 3\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3 \cdot 1 + (-2) = 1 \\
 (b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} [2f(x) - 3g(x)] &= \lim_{x \rightarrow 0} [2f(x)] + \lim_{x \rightarrow 0} [-3g(x)] = 2\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + (-3)\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \\
 &= 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) = 8 \\
 (c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot g(x) &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \right) = 1 \cdot (-2) = -2 \\
 (d) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

3.

 풀이


$$\begin{aligned}
 (a) \quad f(x) &= x^4 - x^2 + 2 \text{ 라 하면, } f(x) \text{ 는 4차 다항함수이므로} \\
 \lim_{x \rightarrow 1} (x^4 - x^2 + 2) &= f(1) = 1 - 1 + 2 = 2 \text{ 이다.} \\
 (b) \quad f(x) &= \frac{x^2 - x}{|x - 1|} = \frac{x(x - 1)}{|x - 1|} \text{ 이라 하면, } 0 < x < 1 \text{ 이면 } f(x) = -x \text{ 이고 } x > 1 \text{ 이면} \\
 f(x) &= x \text{ 이다. 따라서 } \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1 \text{ 이므로 극한이 존재하지 않} \\
 &\text{는다.} \\
 (c) \quad f(x) &= |x| - 1 \text{ 이라 하면, } -1 < x < 0 \text{ 이면 } f(x) = -x - 1 \text{ 이고 } x > 0 \text{ 이면} \\
 f(x) &= x - 1 \text{ 이다. 따라서 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = -1 \text{ 이므로} \\
 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= -1 \text{ 이다.} \\
 (d) \quad f(x) &= \sqrt{(x^2 - 1)^2} \text{ 이라 하면, } \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{(x^2 - 1)^2} = 0 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

5.

 풀이

$$\begin{aligned}
 (a) \quad \text{모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } |\sin x| \leq 1 \text{ 이므로 } \left| \frac{1}{x} \sin x \right| &= \frac{1}{|x|} |\sin x| \leq \frac{1}{|x|}, \text{ 즉} \\
 -\frac{1}{|x|} &\leq \frac{1}{x} \sin x \leq \frac{1}{|x|} \text{ 이다. 또한 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|} = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x = 0 \text{ 이다.} \\
 (b) \quad \text{모든 실수 } x \text{ 에 대하여 } |\cos x| \leq 1 \text{ 이므로 } \left| \frac{1}{x} \cos x \right| &= \frac{1}{|x|} |\cos x| \leq \frac{1}{|x|}, \text{ 즉} \\
 -\frac{1}{|x|} &\leq \frac{1}{x} \cos x \leq \frac{1}{|x|} \text{ 이다. 또한 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|} = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos x = 0 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

7.

 두 함수의 극한이 각각 존재하는 경우에 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 성립


한다. 이 풀이과정에서 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 이 존재하지 않으므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \neq \left(\lim_{x \rightarrow 0} x \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right)$$

이다.

5.3 연습문제

1.


 (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 1}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 1}{3x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{3}{2}$
 $= \frac{3}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 1}{3x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} \right) = \frac{3}{2} \cdot 0 \cdot 1 = 0$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \tan x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x + \tan x}{x}}{\frac{\sin 2x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\tan x}{x}}{2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x}} = \frac{1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}}{2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x}} = \frac{1 + 1}{2 \cdot 1} = 1$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos 2x \right) = \frac{1}{2}$

3.

 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $\left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 1$ 이므로

$$\left| \sin x \cos \frac{1}{x} \right| \leq |\sin x|; \quad -|\sin x| \leq \sin x \cos \frac{1}{x} \leq |\sin x|$$

이다. 한편 $\lim_{x \rightarrow 0} |\sin x| = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos \frac{1}{x} = 0$ 이다.

5.4 연습문제

1.

$\ln(x-1) - \ln x = \ln \frac{x-1}{x} = \ln \left(1 - \frac{1}{x}\right)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$ 이므로 구하고자 하는 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{\ln(x-1) - \ln x\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \ln 1 = 0$$

3.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{x} + e\right) = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + e\right) \right] = \ln e = 1$

(b) $x \rightarrow 2+$ 이므로 $t = x - 2$ 라 하면, $t \rightarrow 0+$ 이고 따라서 구하고자 하는 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \log_3(x-2) = \lim_{t \rightarrow 0+} \log_3 t = -\infty$$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1+} [\ln(x^2-1) - \ln(x-1)] = \lim_{x \rightarrow 1+} \ln \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \ln \frac{(x+1)(x-1)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1+} \ln(x+1) = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) \right] = \ln 2$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} [\log_2(x^2-1) - 2\log_2 x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{x^2-1}{x^2} = \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{x^2} \right)$
 $= \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - (1/x^2)}{1} \right) = \log_2 1 = 0$

5.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+3x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+3x)^{\frac{1}{x}} = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{1}{3x}} \right)^3 = \ln e^3 = 3$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \ln \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right) = \ln e = 1$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \ln(1-3x)^{\frac{1}{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0-} \ln \left((1-3x)^{-\frac{1}{3x}} \right)^{-\frac{3}{2}}$
 $= \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0-} (1-3x)^{-\frac{1}{3x}} \right)^{-\frac{3}{2}} = \ln e^{-3/2} = -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}
 \text{(d) } \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(1 - \frac{x}{3} \right)^{\frac{2}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[\left(1 - \frac{x}{3} \right)^{-\frac{3}{x}} \right]^{-\frac{2}{3}} = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{3} \right)^{-\frac{3}{x}} \right]^{-\frac{2}{3}} \\
 &= \ln (e^{-2/3}) = -\frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

5.5 연습문제

1.

- (a) $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않으므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.
- (b) $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{x-1} = 1$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 좌극한과 우극한이 서로 다르고, 따라서 $x=1$ 에서 불연속이다.
- (c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$ 이고 $f(2) = 2$ 이므로 $f(2) \neq \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 이고, 따라서 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| = \infty$ 이므로 $x=0$ 에서 불연속이다.

3.

- (a) $f(x) = 3x^2 - 2x - 2$ 은 2차의 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다.
- (b) $x=2$ 이면, 함수 $f(x)$ 는 정의되지 않는다. 그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x \neq 2$ 인 모든 실수에서 연속이다.
- (c) $x-1$, $\sqrt{x^2+1}-3$ 은 모든 실수에서 연속이므로 분모 $\sqrt{x^2+1}-3$ 이 0이 아닌 모든 실수에서 연속이다. $\sqrt{x^2+1}-3=0$; $x^2+1=9$; $x=\pm 2\sqrt{2}$ 이므로 $x \neq \pm 2\sqrt{2}$ 인 모든 실수에서 주어진 함수는 연속이다.

5.

$f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 3$$

이고, $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이므로 구하고자 하는 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)} = \sqrt{3}$$

7.

$f(x) = x^2 + \ln x$ 라 하면, $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 연속이므로 폐구간 $[e^{-1}, 1]$ 에서 연속이다.

또한 $f(e^{-1}) = \frac{1}{e^2} - 1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$ 이므로 중간값 정리에 의하여 개구간 $(e^{-1}, 1)$

에서 $f(c) = 0$ 을 만족하는 실수 c 가 적어도 하나 존재한다. 즉, 적어도 하나의 $e^{-1} < c < 1$ 에 대하여 $f(c) = 0$ 이 성립한다.

제5장 연습문제

5.1

$$\textcircled{\text{풀이}} \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left\{\lim_{x \rightarrow 0}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)\right\} = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

5.3

$$\textcircled{\text{풀이}} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2 + x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x(x^2 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + 1} = 1$$

5.5

$$\textcircled{\text{풀이}} x \rightarrow 2 \text{ 이면 } x^2 > 4 \text{ 이고 } |x^2 - 4| = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - 4|}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

5.7

$$\textcircled{\text{풀이}} x \rightarrow 0+ \text{ 이면 } x > 0 \text{ 이고 } |x| = x \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|}\right) \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0+} 0 = 0 \text{ 이다.}$$

5.9

$$\textcircled{\text{풀이}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{3x}{\tan 3x} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

5.11

$$\textcircled{\text{풀이}} t = x - 2 \text{ 라 하면, } x \rightarrow 2 \text{ 이면 } t \rightarrow 0 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(3x - 6)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 3(x - 2)}{x - 2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{3t} \cdot 3 = 3$$

5.13

$$\textcircled{\text{풀이}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{4x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{1}{2} = 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

5.15

$$\textcircled{\text{풀이}} t = x - 1 \text{ 라 하면, } x \rightarrow 1 \text{ 이면 } t \rightarrow 0 \text{ 이고 } x = t + 1 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x - 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \pi(t + 1)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi t}{t} = (-\pi) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \pi t}{\pi t} = -\pi$$

5.17

x° 를 라디안으로 바꾸면, $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^\circ \sin \pi x = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi x}{180} \sin \pi x = \frac{\pi}{180} \cdot \sin \pi = 0$$

5.19

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^x}{2^x + 4^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{2}{4}\right)^x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^x + 1} = 1$

5.21

$t = 3 - x$ 라 하면, $x \rightarrow 3+$ 이면 $t \rightarrow 0-$ 이고 $\frac{3}{t} \rightarrow -\infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3+} e^{\frac{3}{3-x}} = \lim_{t \rightarrow 0-} e^{\frac{3}{t}} = 0 \text{ 이다.}$$

5.23

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = 0$ 이므로 극한이 존재하기 위하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (ax + b) = 0$ 이어야 한다. 따라서

$$\frac{\pi a}{2} + b = 0; \quad b = -\frac{\pi a}{2} \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{ax + b}{\cos x} = a \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - (\pi/2)}{\cos x} \text{ 이다. 이제 } t = x - \frac{\pi}{2} \text{ 라}$$

하면 $x \rightarrow \pi/2$ 일 때, $t \rightarrow 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x - (\pi/2)}{\cos x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\cos(t + (\pi/2))} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{-\sin t} = -1; \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{ax + b}{\cos x} = -a$$

이다. 따라서 $a = -2$, $b = -\frac{\pi a}{2} = \pi$ 이다.

5.25


(a) $\lim_{x \rightarrow 0-} \operatorname{sgn}(x) = -1$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{sgn}(x) = 1$

(c) 좌극한과 우극한이 같지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$ 는 존재하지 않는다.

(d) $x \neq 0$ 이면, $|\operatorname{sgn}(x)| = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} |\operatorname{sgn}(x)| = 1$ 이다.

5.27


 (a)




(b) 모든 정수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow n-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow n+} f(x) = 0$ 이다.

(c) $n < a < n+1$ 이면, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (x - [x]) = a - [a] = f(a)$ 이므로 정수가 아닌 모든 실수에서 연속이다.

5.29

 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 4) = 12$ 이지만 $f(2)$ 가 존재하지 않으므로 $x = 2$ 에서 불연속이다.


5.31

 $f(2) = 2$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (4 - x) = 2$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 2$ 이고 따라서 $x = 2$ 에서 연속이다.

5.33


 $x < 5$ 와 $x > 5$ 에서 $f(x)$ 는 다항함수이므로 연속이다. 따라서 $x = 5$ 에서 연속이 되는 b, c 를 구하면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5-} (bx + 1) = 5b + 1 = f(5) = 6; \quad b = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5+} (x^2 + 2cx + 1) = 25 + 10c + 1 = f(5) = 6; \quad c = -2$$

이다.

5.35

 $f(x) = (x^2 - 1)\cos x + \sqrt{2}\sin x$ 라 하면, 다항함수와 $\cos x$ 그리고 $\sin x$ 가 모든 실수에서 연속이므로 $f(x)$ 는 모든 실수에서 연속이고 따라서 폐구간 $[0, \pi/2]$ 에서 연속이다.

한편 $f(0) = -1 < 0 < f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}$ 이므로 중간값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 을 만족하는 c 가

$(0, \pi/2)$ 안에 적어도 하나 존재한다. 즉, $(c^2 - 1)\cos c + \sqrt{2} \sin c = 0$ 을 만족하는 c 가 $(0, \pi/2)$ 안에 적어도 하나 존재한다. 그러므로 $(0, \pi/2)$ 안에 적어도 하나의 실근을 갖는다.